

Ziekte:	Weren noodzakelijk?	GGD bellen voor advies?
AIDS (HIV)	Nee	Ja, voor overleg
Bof	Nee	Ja
Buiktyfus	Ja, inclusief broertjes en zusjes	Ja
Diaree	Ja, zeker bij bloederige diaree of bij 2x diaree kort achter elkaar bij hetzelfde kind. (Op eigen inzicht)	Ja, bij epedemie
Difterie	Ja, kinderen moeten opgenomen worden in het ziekenhuis	Ja
Dysenterie (Shigella-infectie)	Ja, zeker bij bloederige diaree	Ja, bij epedemie
Hand, mond, voetziekte	Ja, als het kind er ziek van is en als de blaasjes open zijn.	Ja, bij epedemie
Hepatitis A (geelzucht)	Nee, tenzij kind net terug is van vakantie	Ja, wettelijk verplicht! Ook als personeel geelzucht heeft.
Hepatitis B (geelzucht)	Nee	Ja, wettelijk verplicht! Ook als personeel geelzucht heeft.
Hersenvliesontsteking (meningokokken)	Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen.	Ja
Hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën	Nee, wel direct huisarts bellen bij nekstijfheid en luierpijn.	Ja
Hersenvliesontsteking veroorzaakt door virussen	Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen.	Ja
Hoofdluis	Ja, kinderen moeten eerste behandeld zijn, voordat ze weer mogen komen. Zie protocol 9	Nee
Kinkhoest	Nee	Nee
Krentenbaard	Ja, pas als de blaasjes zijn ingedroogd of het kind wordt behandeld met antibiotica. Na 48 uur mag hij/zij komen. Afplakken is niet wenselijk.	Ja, indien er binnen 2 weken 2 of meer gevallen in 1 groep zijn.
Oogontsteking	Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op hygiëne! Huisartsen schrijven vaak geen medicatie meer voor.	Nee
Paratyfus	Ja	Ja
Polio	Overleg met de GGD of wering zinvol is. Bij een eerste geval van polio kan het zinvol zijn om het zieke kind en zijn of haar broertjes en zusjes tijdelijk te weren.	De behandelend arts meldt een geval van mazelen bij de GGD.
Rodehond (rubella)	Ja, risicogroep. (Zie informatie RIVM)*	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken rode hond hebben.
Roodvonk (Scarlatina)	Nee	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.
RSV (respiratoir syncytieel virus)	Nee, let wel op risicogroep (Zie informatie RIVM)*	Overleg bij risicogroep.
Schimmelinfectie van de huid (ringworm, tinea Capitis)	Nee	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben. Overleg met de GGD ook over het informeren van de andere ouders, zodat die alert kunnen zijn.
Schurft (scabies)	Ja	Ja, wanneer drie personen of meer mogelijke of bewezen schurft hebben.

Steenpuisten	Nee, wel afdekken en behandeling van huisarts is nodig.	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben
Tuberculose (TBC)	Bij open TBC wel, anders niet	Ja, om te overleggen.
Vijfde ziekte (erythema infectiosum, parvovirusinfectie)	Nee, let wel op risicogroep	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.
Waterpokken op 't KDV	Ja, risicogroep en besmettingsgevaar, als blaasjes zijn ingedroogd kan het kind weer komen. (Zie informatie RIVM)*	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken waterpokken hebben.
Waterpokken op de BSO	Hierbij volgen wij de richtlijnen van school. Graag in overleg gaan met de Kwaliteitsmedewerker	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken waterpokken hebben.
Zesde ziekte (exanthema subitum)	Nee	Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.
* Zie reader gezondheidsrisico's kindercentra, psz en bso		Revisie 10