

Ziekte:	Weren noodzakelijk?
AIDS (HIV)	Nee
Bof	Nee
Buiktyfus	Ja, inclusief broertjes en zusjes
Diaree	Ja, zeker bij bloederige diaree of bij 2x diaree kort achter elkaar bij hetzelfde kind. (Op eigen inzicht)
Difterie	Ja, kinderen moeten opgenomen worden in het ziekenhuis
Dysenterie (Shigella-infectie)	Ja, zeker bij bloederige diaree
Hand, mond, voetziekte	Ja, als het kind er ziek van is en als de blaasjes nog niet ingedroogd zijn.
Hepatitis A (geelzucht)	Nee, tenzij kind net terug is van vakantie
Hepatitis B (geelzucht)	Nee
Hersenvliesontsteking (meningokokken)	Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen.
Hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën	Nee, wel direct huisarts bellen bij nekstijfheid en luierpijn.
Hersenvliesontsteking veroorzaakt door virussen	Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen.
Hoofdluis	Ja, kinderen moeten eerste behandeld zijn, voordat ze weer mogen komen. Zie protocol 9
Kinkhoest	Nee
Koorts	Ja, er wordt contact opgenomen met de ouder voor overleg of het kind wel/niet opgehaald (moet) worden.
Krentenbaard	Ja, pas als de blaasjes zijn ingedroogd of het kind wordt behandeld met antibiotica. Na 48 uur mag hij/zij komen. Afplakken is niet wenselijk.
Oogontsteking	Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op hygiëne! Bij vaak schoonmaken contact met ouders.
Loopoor	Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op hygiëne! Bij vaak schoonmaken contact met ouders.
Paratyfus	Ja
Polio	Overleg met de GGD of wering zinvol is. Bij een eerste geval van polio kan het zinvol zijn om het zieke kind en zijn of haar broertjes en zusjes tijdelijk te weren.
Rodehond (rubella)	Ja, risicogroep. (Zie informatie RIVM)*
Roodvonk (Scarlatina)	Nee
RSV (respiratoir syncytieel virus)	Nee, let wel op risicogroep (Zie informatie RIVM)*
Schimmelinfectie van de huid (ringworm, tinea Capitis)	Ja, na bezoek arts en eventuele behandeling met medicijnen na 48 uur mag het kind weer komen.
Schurft (scabies)	Ja
Steenpuisten	Nee, wel afdekken en behandeling op de groep en huisarts is nodig.
Tuberculose (TBC)	Bij open TBC wel, anders niet

Vijfde ziekte (erythema infectiosum, parvovirusinfectie)	Nee, let wel op risicogroep zwangeren (eerste helft v/d zwangerschap en/of zwangere pm-ers op de groep)
Wormpjes	Ja. Pas 48 uur na behandeling mag het kind weer naar de groep komen.
Waterpokken op 't KDV	Ja, risicogroep en besmettingsgevaar, als blaasjes zijn ingedroogd kan het kind weer komen. (Zie informatie RIVM)*
Waterpokken op de BSO	Hierbij volgen wij de richtlijnen van school. Graag in overleg gaan met de manager algemene zaken
Zesde ziekte (exanthema subitum)	Nee

* Zie reader gezondheidsrisico's kindercentra, psz en bso	
---	--

GGD bellen voor advies?
Ja, voor overleg
Ja
Ja
Ja, bij meerdere kinderen op dezelfde groep
Ja
Ja, bij epedemie
Ja, indien er binnen 2 weken 2 of meer gevallen in 1 groep zijn.
Ja, wettelijk verplicht! Ook als personeel geelzucht heeft.
Ja, wettelijk verplicht! Ook als personeel geelzucht heeft.
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja, indien er binnen 2 weken 2 of meer gevallen in 1 groep zijn.
Nee
Nee
Ja
De behandelend arts meldt een geval van mazelen bij de GGD.
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken rode hond hebben. De groep meldt de eerste aanmelding bij de kwaliteitsmedewerker ivm risicogroep
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.
Overleg bij risicogroep.
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben. Overleg met de GGD ook over het informeren van de andere ouders, zodat die alert kunnen zijn.
Ja, wanneer drie personen of meer mogelijke of bewezen schurft hebben.
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben
Ja, om te overleggen.

Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.
Nee
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken waterpokken hebben.
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken waterpokken hebben.
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag hebben.

Revisie 12